

~2 DE 3


**PACIENTES CON
DT2**

**AÚN NO HAN TENIDO UN
EVENTO CV O RENAL¹**

**PERO ELLOS
SIGUEN EN**

RIESGO





IC Y ERC

**SON LAS MÁS COMUNES Y
TEMPRANAS
COMPLICACIONES CV EN
PACIENTES CON DT2^{1,2}**

FORXIGA VA MÁS ALLÁ DE LA HbA_{1c}

Reduciendo el riesgo de
hospitalización por IC y muerte
CV en un **17% RRR** (0.9% ARR)
vs. placebo³


forxiga.
(dapagliflozina)


xigduo.
(dapagliflozina y metformina HCl)

Tasas comparables de MACE vs placebo (8.8% vs 9.4%; HR 0.93; IC del 95%, 0.84, 1.03; p=0.17). En el estudio DECLARE, FORXIGA mostró ausencia de inferioridad con respecto a MACE (límite superior del IC del 95%, <1.3; p<0.001 para ausencia de inferioridad).

FORXIGA iSGLT2

Ha demostrado una
reducción en el riesgo de
Hospitalización por IC en
pacientes con DT2 con múltiples
factores de riesgo CV o Enfermedad

CV 27% RRR (0.8% ARR)^{3,4}

(Criterio de valoración exploratorio*)


forxiga.
(dapagliflozina)


xigduo.
(dapagliflozina y metformina HCl)

*Estadísticamente significativo.

FORXIGA no resultó en una tasa menor de muerte CV en la población general de DECLARE vs placebo: 2.9%. FORXIGA vs 2.9% placebo (HR 0.98; IC del 95%, 0.82, 1.17).³

PRESCRIBA FORXIGA HOY

Trate a su paciente más allá
de la HbA_{1c} para proteger el
corazón de sus pacientes
mañana.³


forxiga.
(dapagliflozina)


xigduo.
(dapagliflozina y metformina HCl)

FORXIGA SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD

El perfil de seguridad y tolerabilidad está bien establecido mediante un extenso programa de desarrollo clínico^{3,4,6,7}


forxiga.
(dapagliflozina)


xigduo.
(dapagliflozina y metformina HCl)

Información para prescribir

FORXIGA Diabetes Mellitus tipo 2, está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 para:

El tratamiento de la diabetes como complemento de la dieta y ejercicio. FORXIGA puede administrarse como monoterapia o en combinación con otros medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con diabetes mellitus tipo II y enfermedad cardiovascular establecida o con múltiples factores de riesgo cardiovascular.

FORXIGA Insuficiencia cardíaca, está indicado en adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.

FORXIGA: aprobación ISP (Instituto de Salud Pública) de Chile. Res. RW N° 7366/21 y 7368/21 (24-mar-2021).

XIGDUO XR: está indicado en adultos con diabetes mellitus de tipo 2 cuando el tratamiento tanto con dapagliflozina como metformina resulta adecuado:

Para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 como complemento de la dieta y ejercicio.

Para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en adultos con diabetes mellitus tipo II y enfermedad cardiovascular establecida o con múltiples factores de riesgo

cardiovascular. Xigduo XR aprobación ISP (Instituto de Salud Pública) de Chile. Res. RW N° 33/20, 34/20, 35/20, 36/20 (02-ene-2020).

ARR = reducción de riesgo absoluto; IC = Intervalo Confianza; ERC = enfermedad renal crónica; CV = cardiovascular; ECV = Enfermedad Cardiovascular; eGFR = tasa estimada filtración glomerular; HbA_{1c} = Hemoglobina glicosilada; IC = Insuficiencia cardíaca; HR = cociente de riesgo; MACE = eventos adversos cardiovasculares mayores; iSGLT2 = Inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa 2; HIC = Hospitalización por Insuficiencia Cardíaca; RRR = Reducción de riesgo relativo; DT2 = Diabetes tipo 2;

Referencias

1. Birkeland KI, et al. Oral presentation at the 55th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting; 16–20 September 2019; Barcelona, Spain. Presentation #126. 2. Bergenstal RM, et al. *Am J Med.* 2010;123(4):374.e9-e18. 3. Wiviott SD, et al. *N Engl J Med.* 2019;380(4):347-357. 4. Forxiga [summary of product characteristics]. Södertälje, Sweden; AstraZeneca AB; 2020. 5. Mosenzón O, et al. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2019;7(8):606-617. 6. Bailey CJ, et al. *Lancet.* 2010;375(9733):2233-2233. 7. Rosenstock J, et al. *Arch Endocrinol Metab.* 2018;62(4):424-430.

Material Promocional para uso exclusivo Profesionales de la Salud.

PromoMats ID: CL-xxxx, Agosto 2021.

Isidora Goyenechea N° 3477, piso 2, Las Condes, Santiago. Teléfono: +56 2 2798 0800 Fax: +56 2 2798 0803

En caso de que desee información médica por favor escribanos a: infomedicaazchile@astrazeneca.com

Para reportar un evento adverso enviar un mail a farmacovigilanciachile@astrazeneca.com o ingresar al link: <http://ugr.to/ae-chile>

Aviso de Privacidad: <http://ugr.to/aviso-privacidad>

Desuscribirse (OPT OUT): <http://ugr.to/opt-out-ch>


forxiga
(dapagliflozina)




xigduo
(dapagliflozina y metformina HCl)



AstraZeneca 